

VINHA

Míldio

As condições climáticas que se fizeram sentir em toda a região, criaram condições favoráveis à formação de infeções primárias de míldio nas vinhas da região.



Aconselhamos por isso, os Srs. Agricultores, a protegerem a vinha contra esta doença.

Tendo em consideração que a vinha se encontra em fase de crescimento ativo, aconselhamos que seja dada preferência a um fungicida sistémico que possua ação anti-esporulante (consultar lista anexa).

Oídio

As condições climáticas são também favoráveis ao desenvolvimento desta doença, sendo por isso necessário proteger a vinha contra este fungo.

Nas vinhas que à data do tratamento possuam já desenvolvimento vegetativo adiantado (cachos separados), deverá ser adicionado à calda um fungicida anti-oídio sistémico do grupo dos IBE (consultar lista anexa).

Nas vinhas com menor desenvolvimento vegetativo, aconselhamos a aplicação de enxofre molhável juntamente com o produto anti-míldio.



Podridão Negra (Black Rot)

Nas vinhas com historial de Black Rot, que em anos anteriores tenham manifestado sintomas, deverá existir o cuidado de selecionar os fungicidas que possuam também eficácia contra esta doença.

BATATEIRA

Míldio

O estado do tempo também tem decorrido favorável ao aparecimento de infeções de míldio, pelo que, estando já emergido, deve proteger o seu batatal, com um produto sistémico da lista disponível no site da DGAV: **SIFITO- Sistema de Gestão das Autorizações de Produtos Fitofarmacêuticos** - [Sifito \(dgav.pt\)](https://dgav.pt)

